



BIOABORTOGEN® H



Indicaciones.

Vacuna para la prevención de enfermedades que provocan infertilidad y abortos en bovinos, ocasionados por los microorganismos presentes en la composición.

Composición.

Suspensión acuosa inactivada de herpesvirus bovino (BoHV) tipo 1, virus de la Diarrea Viral Bovina (BVDV) tipos 1 y 2 y cepas bacterianas de *Campylobacter fetus fetus*, *Campylobacter fetus venerealis*, *Histophilus somni* y *Leptospira interrogans Pomona*.

Dosis y vía administración.

5 mL por vía subcutánea, en la tabla del cuello o detrás de la paleta.

Esquema de vacunación sugerido. Primovacunación (cualquier categoría que recibe esta vacuna por primera vez): 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días. **Cría. Toros y vaquillonas:** **Primera dosis:** 60 días previos al servicio o inseminación artificial (IA). Segunda dosis: 30 días previos al servicio o inseminación artificial (IA). **Vacas (revacunación):** Aplicar 30 días previos al servicio o inseminación artificial (IA). **Novillas:** Primera dosis: 60 días previos al servicio o inseminación artificial (IA). Segunda dosis: 30 días previos al servicio o inseminación artificial (IA). **Vacas y toros:** Aplicar una dosis cada 6 meses. En vacas y vaquillonas de rodeos de cría y tambo con altas mermas en el período comprendido entre el tacto y la parición se sugiere aplicar una dosis al tacto.

Conservación.

Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz. No congelar.

Presentación.

Frascos de 125 mL y 250 mL.