



FLOK® 3,15%



Composición.

Doramectina 3,15%; excipientes, c.s.p 100 mL.

Dosis y vía de administración.

Bovinos: Usar a razón de 1 mL/50 kg de peso vivo (equivalente a 630 mcg de doramectina), en dosis única. Por inyección subcutánea, aplicada en la mitad posterior de la tabla del cuello por delante de la paleta, o por detrás de ésta, en la parte superior de la región del costillar. Usar una jeringa multidosis, con una aguja 18x 1/2, y de igual manera que para cualquier inyectable, mantener las normas de asepsia, para evitar así lesiones posteriores. La jeringa y las agujas deben ser esterilizadas previo a su uso.

Indicaciones.

Parásitos gastrointestinales: *Ostertagia ostertagi* (adultos); *O. ostertagi* inhibidos (L4); *O. lyrata* (adultos e inmaduros); *Haemonchus placei* (adultos e inmaduros); *Mecistocirrus digitatus* (adultos); *Trichostrongylus axei* (adultos e inmaduros); *T. colubriformis* (adultos e inmaduros); *Cooperia punctata* (adultos e inmaduros); *C. pectinata* (adultos e inmaduros); *C. oncophora* (adultos e inmaduros); *Cooperia spp* (adultos e inmaduros); *Oesophagostomum radiatum* (adultos e inmaduros); *Nematodirus helveticus* (adultos); *N. spathiger* (adultos); *Strongyloides papillosum* (adultos); *Bunostomum phlebotomum* (adultos e inmaduros); *Toxocara vitulorum* (adultos).

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (adultos, inmaduros e inhibidos). **Ectoparásitos:**

Miasis cutáneas: *Dermatobia hominis* (ura, berne, nuche o tórsalo) (estadíos larvarios);

Hypoderma bovis ("heel flies") (estadíos larvarios); *Hypoderma lineatum* (estadíos larvarios);

Cochliomyia hominivorax (bichera o gusanera) (estadíos larvarios); *Chrysomya bezziana* (estadíos larvarios). **Garrapatas:** *Rhipicephalus microplus*. Aprobado como garrapaticida con una eficacia del 98.56% en Argentina y 95% en Brasil.

ENDECTOCIDAS



Precauciones

No utilizar el producto por vía intramuscular o endovenosa. No administrar a animales estresados, con cuadros febriles o débiles. No reutilizar los envases vacíos. Aplicar usando agujas y jeringas estériles. Almacenar en su envase original, al resguardo de la luz directa y a las temperaturas indicadas.

Período de retiro

No sacrificar bovinos para consumo humano hasta haber transcurrido 53 días del último tratamiento. No administrar a hembras en lactancia cuya leche se destine a consumo humano y/o industrialización.

Advertencias

En animales sensibilizados cualquier producto inyectable puede producir en forma esporádica, reacciones alérgicas. Ante la presentación de síntomas como disnea, temblores incoordinación, babeo, edema, utilizar adrenalina, corticoides y/o antihistamínicos según el criterio del Médico Veterinario.

Conservación

Entre 5°C y 30°C. Fuera del alcance de los niños y animales domésticos.