



# POLICLOSTRIGEN® T12



### Indicaciones.

Vacuna inactivada para la inmunización de bovinos, ovinos y caprinos contra Carbón (Mancha), Gangrena Gaseosa, Cabeza Hinchada, Hepatitis Necrozante, Enterotoxemia, Hemoglobinuria, Tétanos, Muerte Súbita y Pasteurellosis.

### Composición.

Bacterinas y/o toxoides de *Clostridium chauvoei* (1,5x10<sup>9</sup> células viables), *Clostridium septicum* (5x10<sup>9</sup> células viables) *Clostridium novyi* tipo A (1,5x10<sup>9</sup> células viables) *Clostridium novyi* tipo B (1,5x10<sup>9</sup> células viables), *Clostridium perfringens* A (100 DLM o 0,5 U.I. de toxina Alfa), *Clostridium perfringens* C (500 DLM o 10 U.I. de toxina Beta), *Clostridium perfringens* D (1000 DLM o 5 U.I. de toxina Epsilon), *Clostridium haemolyticum* (1,5x10<sup>9</sup> células viables) *Clostridium sordellii* (2x10<sup>9</sup> células viables), *Clostridium tetani* (2x10<sup>5</sup> DLM o 20 U.I. de toxinatetánica), *Pasteurella multocida* Grupo A (500 x 10<sup>6</sup> bacterias) y *Mannheimia haemolytica* (250 x 10<sup>6</sup> bacterias), en gel de hidróxido de aluminio.

### Dosis y vía administración.

**Bovinos:** 5 mL.

**Ovinos:** 2 mL.

**Vía:** subcutánea.

**Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez):** 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

### Conservación.

Mantener entre 2° C y 8 ° C. No congelar.

### Presentación.

Frascos de 20 y 50 dosis de 5 mL.

## BIOLÓGICOS



**Transportes (remates, ferias):** 15 días antes del transporte.

**Ovinos y caprinos:** Corderos/as y chivitos/as: 15 días antes del descole, señalada, castración, esquila.

**Borregas preñadas:** 1er dosis 60 días antes del parto. 2da dosis 30 días antes del parto.

**Ovejas y cabras preñadas:** 30 días antes del parto.

**Majada general y carneros, chivos/ castrones:** 15 a 30 días antes de la esquila. Ingreso a verdeos o cambios de alimentación. En animales adultos vacunados se recomienda una dosis anual de refuerzo. En zonas de alta incidencia de *Clostridium novyi* y *Clostridium haemolyticum* se recomienda la vacunación cada 6 meses. Se aconseja la revacunación ante cuadros de parasitos gastrointestinales.

### Conservación.

Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz.

No congelar.

### Presentación.

Frascos de 125 mL y 250 mL.